

Anwendungshinweise HB-Nematoden

Zielorganismen: Gefurchter Dickmaulrüssler

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Mindestens **12 °C Bodentemperatur** für einige Stunden am Tag
- Böden oder Substrate sollten feucht sein
- bei bedecktem Himmel oder abends ausbringen, da Nematoden UV-empfindlich sind
- mit viel Wasser (mindestens 1.000 Liter/ha) ausbringen
- nach der Ausbringung mit mindestens 1 Liter/m² nachwässern, um an den Pflanzen haftende Nematoden abzuspielen
- Boden nach der Ausbringung idealerweise für 2 - 4 Wochen feucht halten

AUFWANDMENGE

- **Boden:** 500.000 Nematoden/m²
- **Töpfe, Container:** 10.000 Nematoden/Liter Substrat
- **Erdbeeren:** 25.000 Nematoden/Pflanze

AUSBRINGUNG

Pflanzenschutzgerät

- Spritze vor Gebrauch gut spülen
- Düsendurchmesser mindestens 0,8 mm. Gut geeignet sind Flachstrahl- oder Hohlkegeldüsen
- Alle Filter und Siebe entfernen
- Behälter zu 3/4 mit Wasser auffüllen und Rührwerk anschalten
- Bis zu 5 Beutel in einem Eimer mit 10 Liter Wasser auflösen. Gut rühren.
- Rührwerk starten und Nematodenlösung über das Sieb in den Behälter geben
- Behälter mit Wasser auffüllen
- Während der Ausbringung Nematodenlösung stetig durchmischen

Tauchen

- 500 Millionen in 800 Liter Wasser auflösen
- Nematodenlösung durch Einblasen von Druckluft ständig umwälzen
- 800 Liter reichen für ca. 4.000 Pflanzen mit etwa faustgroßem Wurzelballen

Gießbehandlung Container

- 500 Millionen Nematoden in 1.000 Liter Wasser auflösen und verteilen

Topfvolumen [Liter]	ml pro Topf	Töpfe/Packung
0,5	10	100.000
0,8	16	62.500
1,5	30	33.333

Erdbeeren (Tauchen)

- 500 Mio. Nematoden in 80 Liter Wasser auflösen
- 0,4 % Methylzellulose (Kleister) hinzugeben, um die Nematoden in der Schwebe zu halten
- Pro Frigopflanze ca. 2 ml
- ausreichend für ca. 40.000 Pflanzen

Erdbeeren (Gießbehandlung)

- pro Pflanze 200 ml Spritzbrühe mit einer Lanze um die Pflanze herum verteilen oder in die Wurzelzone injizieren
- 500 Millionen Nematoden in 4.000 Litern Wasser reichen für ca. 20.000 Pflanzen